

Tafinlar® (Dabrafenib) in Kombination mit Mekinist® (Trametinib)

Pour le traitement de patients adultes avec cancer bronchique non à petites cellules (NSCLC; non-small cell lung cancer) métastatique – Pas pour d'autres indications.

Demande de prise en charge à l'attention du médecin-conseil

Autorisation par Swissmedic (extrait): Tafinlar en association avec le tramétinib peut être utilisé dans le traitement des patients adultes atteints d'un cancer pulmonaire non à petites cellules (NSCLC) métastatique porteur de la mutation V600E du gène BRAF.

Données du patient:

Nom: Prénom: Né(e) le:

sexe: ♀ ♂ Rue: Complément d'adresse:

NPA: Lieu:

Assurance: N° d'assurance:

Adresse Assureur (Service de médecin-conseil ou MC): Complément d'adresse:

NPA: Lieu:

Données médicales

La patiente/le patient est atteint d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique avec une mutation exprimant la mutation BRAF V600E.

Description des autres diagnostics pertinents ainsi que des éventuels traitements antérieurs et de l'état clinique actuel (état général, plaintes, charge tumorale, évolution):

Justification du choix d'un traitement par Tafinlar® (Dabrafenib) en association avec Mekinist® (Trametinib) (ne figurant pas sur la liste des spécialités). Veuillez également joindre la littérature correspondante:

Médecin requérant:

Nom: Prénom:

Rue: Complément d'adresse:

NPA: Lieu: Tél.:

Fax: E-Mail:

Exercant à l'hôpital ajoutez le nom de l'hôpital: Département:

Date.: