

**Limitatio:** Pour le traitement de l'hépatite C chronique (HCC) de génotype 1 et 4 chez l'adulte.

La durée maximale du remboursement pour les patients est limitée de la manière suivante :

- patients naïfs de tout traitement et prétraités ayant le génotype 1a sans polymorphisme de la NS5A\* associé à une résistance dans le génome du VHC : 12 semaines
- patients naïfs de tout traitement et prétraités ayant le génotype 1a avec polymorphisme de la NS5A\* associé à une résistance dans le génome du VHC : 16 semaines avec ribavirine
- patients naïfs de tout traitement ayant le génotype 1b\*\* avec fibrose hépatique de degré 0, 1 ou 2: 8 jusqu'à 12 semaines.
- patients naïfs de tout traitement ayant le génotype 1b\*\* avec fibrose hépatique de degré 3 ou 4 (score Métavir) et patients prétraités: 12 semaines.
- patients naïfs de tout traitement ou prétraités ayant le génotype 4 avec récurrence (Relapser): 12 semaines.
- patients prétraités\* ayant le génotype 4 avec un échec virologique\*\*\* pendant le traitement, sans cirrhose et avec une charge virale basale < 2'000'000 UI/ml : 12 semaines.
- patients prétraités\* ayant le génotype 4 avec un échec virologique\*\*\* pendant le traitement : 16 semaines avec ribavirine.

La prescription doit se faire exclusivement par des spécialistes en gastro-entérologie, en particulier les détenteurs du titre hépatologue ou par des spécialistes en infectiologie ainsi que par des médecins sélectionnés expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC. La liste correspondante des médecins expérimentés en toxicomanie et dans le traitement de l'HCC est consultable à l'adresse suivante:

<http://www.bag.admin.ch/sl-ref>.

Lors d'un traitement de 16 semaines avec Zepatier, à la demande de la caisse maladie chez qui la personne assurée était affiliée au moment de la perception, MSD Merck Sharp & Dohme AG rembourse le prix de fabrique de Fr. 9'825.75 du quatrième emballage administré de manière démontrable. La taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être récupérée en sus de ce montant. En principe, la demande de remboursement doit être effectuée dans les 3 mois suivant l'administration.

A l'exception de la ribavirine, des combinaisons avec d'autres médicaments pour le traitement de l'HCC ne seront pas remboursées.

Lors d'une hépatite C chronique du génotype 1a, les coûts du test des polymorphismes de la NS5A associés à une résistance seront pris en charge par la firme MSD Merck Sharp & Dohme AG.

\* Polymorphismes de la NS5A (M28T/A, Q30E/H/R/G/K/L/D, L31M/V/F, H58D et Y93C/H/N)

\*\* Inclut les patients avec des sous-types connus du génotype 1 chez qui il ne s'agit pas du sous-type 1a ou 1b.

\*\*\* Chez des patients avec un échec virologique pendant le traitement, il s'agit de ceux chez qui, dans le cadre d'un traitement précédent, une non-réponse (Null-Response), une réponse partielle, une percée virologique, respectivement une remontée de la charge virologique (Rebound) ou une intolérance est apparue.

**Donnés du patient:**

Nom:  Prénom:  née le:

Sexe:  ♀  ♂ Rue:  Complément d'adresse:

NPA:  Lieu:

Assurance:  N° d'assurance:

Adresse Assureur (service de médecin-conseil ou MC):  Complément d'adresse:

NPA:  Lieu:

Il s'agit d'un patient (d'une patiente) avec une hépatite C du génotype:

1a  1b  4

autre, à savoir:

Sur la durée planifiée du traitement:

GT1a  12 Semaines Patient sans polymorphisme de la NS5A associé à une résistance

Le test d'un polymorphisme de la NS5A associé à une résistance est encore en suspens. Si celui-ci montre une résistance, cela vous sera communiqué en vue d'obtenir la garantie de prise en charge des coûts pour une durée totale de 16 semaines avec la Ribavirine.

Le patient est:

naïf de tout traitement  prétraité

- 16 semaines avec Ribavirine Patient avec un polymorphisme de la NS5A associé à une résistance\*\* dans le génome du VHC  
Le patient est:  
 naïf de tout traitement  prétraité (voir ci-dessous)
- GT 1b\*\*\*  8 semaines patient naïf de tout traitement avec une fibrose hépatique des degrés 0 à 2 (score Métavir)  
 12 semaines Patient naïf de tout traitement avec une fibrose hépatique des degrés 0 à 4 (score Métavir) ou patient prétraité\*. Si prétraité, voir ci-dessous:
- GT4  12 semaines  Patient naïf de tout traitement ou prétraité\* avec récurrence (Relapser)  
Le patient est:  
 naïf de tout traitement  prétraité (voir ci-dessous)  
 Patient prétraité avec un échec virologique\*\*\*\* pendant le traitement sans cirrhose et avec une charge virale basale < 2'000'000 UI/ml.
- 16 Wochen, avec Ribavirine Patient prétraité avec un échec virologique\*\*\*\* pendant le traitement sans cirrhose et avec une charge virale basale < 2'000'000 UI/ml.

Veuillez répondre pour autant que le patient **soit prétraité**:

Le prétraitement a eu lieu (MM/AAAA):  et a duré:  semaines

Le traitement a eu lieu avec le médicament suivant (les médicaments suivants):

Evolution et résultat:

Raison du traitement actuel:

- récurrence/échec du traitement  nouvelle infection  
 intolérance au traitement précédent. Si oui, lequel:

Le patient/ est sur une liste de transplantation ou a déjà reçu une transplantation hépatique. Procédure planifiée:

Remarques, informations complémentaires:

**Médecin formulant la demande:**

Nom:

Prénom:

Rue:

Complément d'adresse:

NPA:

Lieu:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Exerçant à l'hôpital ajoutez le nom de l'hôpital:

Département:

Date: