

# Adcetris® (Brentuximab Vedotin)

Kostengutsprache gesuch z. H. des Vertrauensarztes

## Limitatio (Auszug)

Für alle vergütungspflichtigen Indikationen gilt:

Die Behandlungen bedürfen der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes.

Der behandelnde Arzt ist verpflichtet, die erforderlichen Daten für alle vergüteten Indikationen laufend im vorgegebenen Internettool des Registers, abrufbar auf <http://www.lymphomaregistry.ch>, zu erfassen. Eine schriftliche Einwilligung des Patienten muss vorliegen. Es sind folgende Daten zu erfassen:

1) Bei Therapiebeginn: Geburtsjahr, Geschlecht und das Gewicht der Patienten und Indikationsstellung (HL (Stadium IV), rrHL, PTCL, rrsALCL, CTCL) sowie die Vortherapien für rrHL, rrsALCL oder CTCL. Beim CTCL und PTCL ist die CTCL- resp. PTCL-Histologie sowie der CD30-Expressions-Wert zu erfassen. Sofern beim CTCL keine vorgängige Therapie mit Methotrexat durchgeführt wurde, ist der Grund anzugeben.

2) Applikationsdatum, Dosierung und Anzahl verwendete Ampullen von Adcetris pro Zyklus, Zusatztherapien, Datum Therapieende sowie Angabe des Grundes für Therapieende.

**Auszug Hodgkin-Lymphom (HL):** Befristete Limitation bis 30.11.2026

## HL (Stadium IV), Kombinationstherapie (mit Preismodell)

Vollständige Limitatio siehe Spezialitäten ([www.spezialitaetenliste.ch](http://www.spezialitaetenliste.ch)).

Folgender Indikationscode ist an den Krankenversicherer zu übermitteln: **19989.01**

### Personalien Patientin/Patient:

Name:

Vorname:

Geb. Datum

Geschlecht:

 ♀  ♂

Strasse:

Adresszusatz:

PLZ:

Ort:

### Krankenversicherer:

Versicherten-Nr.:

Adresse Versicherer (VAD bzw. Vertrauensarzt):

Adresszusatz:

PLZ:

Ort:

### Medizinische Daten

Erwachsene(r) (≥ 18 Jahre) Patientin/Patient ist an einem CD30+ Hodgkin-Lymphom erkrankt.

Stadium:

Diagnose gestellt (MM/JJJJ):

Es handelt sich um eine Erstlinientherapie

Gewicht der Patientin/des Patienten (kg):

Benötigte Dosis (mg):

### Vorgesehene Therapie mit Adcetris®

Die empfohlene Dosierung in Kombination mit einer AVD-Chemotherapie beträgt 1,2 mg/kg, verabreicht als intravenöse Infusion über 30 Minuten am 1. und 15. Tag jedes 28-tägigen Zyklus; Dauer der Behandlung 6 Zyklen. Adcetris wird in einer Kombinationstherapie mit folgenden drei Medikamenten eingesetzt, bestehend aus Doxorubicin, Vinblastin und Dacarbazin (AVD):

1. Medikament

Produktname:

Abgabe gemäss Fachinformation

Andere Dosierung (bitte auch kurz begründen) nämlich:

2. Medikament

Produktname:

Abgabe gemäss Fachinformation

Andere Dosierung (bitte auch kurz begründen) nämlich:

3. Medikament

Produktname:

Abgabe gemäss Fachinformation

Andere Dosierung (bitte auch kurz begründen) nämlich:

Bemerkungen, Ergänzungen:

**Anfragender Arzt/Ärztin**

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ:

Ort:

Tel.

Fax:

E-Mail:

bei Spital zusätzlich Name des Spitals:

Abteilung:

Datum: