

Forsteo® (Teriparatid)

Kostengutsprache gesuch

Swissmedic-Zulassung: Forsteo ist angezeigt zur Behandlung postmenopausaler Frauen mit manifester Osteoporose und hohem Frakturrisiko. Bei postmenopausalen Frauen mit Osteoporose wurde eine signifikante Reduktion der Inzidenz von vertebralem und nicht vertebralem Frakturen gezeigt. Forsteo ist angezeigt bei Männern mit primärer oder hypogonadaler Osteoporose mit hohem Frakturrisiko. Bei Männern mit primärer oder hypogonadaler Osteoporose erhöht Forsteo die Knochenmineraldichte. Behandlung der Glukokortikoid-induzierten Osteoporose bei Erwachsenen mit erhöhtem Frakturrisiko. Link [Swissmedicininfo](#).

Personalien Patient(in):

Name: Vorname: Geb.-Dat.:

Geschlecht: ♀ ♂ Strasse: Adresszusatz:

PLZ: Ort:

Krankenversicherer: Versicherten-Nr.:

Adresse Versicherer: Adresszusatz:

PLZ: Ort:

- Zur First-line Behandlung der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und primärer oder hypogonadaler Osteoporose bei Männern mit sehr hohem Frakturrisiko.
 - T-score \leq - 2.5 und zwei oder mehrere bestehende Wirbelkörperfrakturen (Genant Grad 2 oder 3)
 - T-score \leq - 3.5 und mindestens eine bestehende Wirbelkörperfraktur (Genant Grad 2 oder 3)
 - T-score \leq - 2.5 und eine Hüftfraktur
- Zur First-line Behandlung der manifesten Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und primärer oder hypogonadaler Osteoporose bei Männern
- Zur First-line Behandlung der Glukokortikoid-induzierten Osteoporose bei Frauen und Männern

Diagnose (nur für den Vertrauensarzt bestimmt):

Therapiealternativen? Begründung und Erläuterung der Indikationsstellung für Forsteo (bitte Literatur beilegen)

Bemerkungen, Ergänzungen:

Arzt/Ärztin:

Name: Vorname:

Strasse: PLZ: Ort:

Tel. Fax: E-Mail:

bei Spital zusätzlich Name des Spitals: Abteilung:

Datum: