

# Lynparza® (Olaparib)

## Kostengutsprache gesuch zu Händen des Vertrauensarztes

Indikation: Ovarialkarzinom nach Erstlinienchemotherapie, Kombinationstherapie mit Bevacizumab

Limitatio: siehe SL

**Hinweis auf Limitatio:** Bei einer Therapiedauer ab Monat 25 besteht ein Preismodell. Die Rückerstattung auf das Bevacizumab-Präparat, eingesetzt in der Kombination mit Lynparza, ist in der Limitation des Bevacizumab Präparates festgelegt. Folgender Code ist an den Krankenversicherer zu übermitteln: 20852.02

### Personalien Patientin:

Name:	<input type="text"/>	Vorname:	<input type="text"/>	Geb. Datum:	<input type="text"/>
Strasse:	<input type="text"/>	Adresszusatz:	<input type="text"/>		
PLZ:	<input type="text"/>	Ort:	<input type="text"/>		

### Krankenversicherer:

Krankenversicherer:	<input type="text"/>	Versicherten-Nr.:	<input type="text"/>
Adresse Versicherer (VAD oder Vertrauensarzt):	<input type="text"/>	Adresszusatz:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>	Ort:	<input type="text"/>

### Medizinische Daten:

Die Patientin ist an einem fortgeschrittenem, high-grade serösem Ovarialkarzinom mit einer BRCA-Mutation oder einer anderen homologen Rekombinationsdefizienz (HRD) mit genomischer Instabilität im Anschluss an eine mit Bevacizumab kombinierte Platin-Taxan-haltige Erstlinien-Chemotherapie erkrankt.

FIGO Stadium:  III  IV

BRCA-Mutation oder eine andere homologische Rekombinationsdefizienz (HRD) mit genomischer Instabilität wurde vor Beginn der Behandlung mit folgender validierten Testmethode festgestellt:

Zur Platin-Taxan-haltigen Vortherapie:

Mindestens 6, maximal 9 Behandlungszyklen. Forderung gemäss Limitatio: hiervon mindestens die letzten 3 Zyklen in Kombination mit Bevacizumab. Ausnahme: im Falle einer zytoreduktiven Intervalloperation dürfen die Patienten nur 2 Zyklen Bevacizumabin Kombination mit den letzten 3 Zyklen einer platinbasierten Chemotherapie erhalten haben.

oder

Mindestens 4 Behandlungszyklen im Falle von nichthämatologischer Toxizität aufgrund von Platin.

### Zur jetzt geplanten Therapie:

Kombinationstherapie mit Bevacizumab. Die Behandlung erfolgt für maximal 15 Monate (inkl. den Zyklen verbreicht in Kombination mit der Chemotherapie). Die Behandlung mit Lynparza erfolgt bis zur Progression. Für Patientinnen, die sich nach 2 Jahren im kompletter Remission befinden (kein radiologischer Tumornachweis), beträgt die vergütete Therapiedauer 24 Monate.

Bemerkungen/Ergänzungen:

### Anfragender Arzt/Ärztin:

Name:	<input type="text"/>	Vorname:	<input type="text"/>
Adresse:	<input type="text"/>	Adresszusatz:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>	Ort:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>	Tel.:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>		
bei Spital, zusätzlich Name des Spitals:	<input type="text"/>	Abteilung:	<input type="text"/>
Datum:	<input type="text"/>		