

# Revestive® (Teduglutid)

## Kostengutsprache gesuch zu Handen des Vertrauensarztes

**Swissmedic-Zulassung:** Revestive ist indiziert zur Behandlung von Patienten mit Kurzdarmsyndrom ab dem Alter von 1 Jahr, die abhängig von parenteraler Ernährung sind. Nach einem chirurgischen Eingriff sollte zunächst eine Phase der intestinalen Adaption abgewartet werden, und die Patienten sollten sich in einer stabilen Phase befinden.

### Personalien Patient(in):

Name:  Vorname:  Geb. Datum:

Geschlecht:  ♀  ♂ Gewicht:  kg Strasse:  Adresszusatz:

PLZ:  Ort:

Krankenversicherer:  Versicherten-Nr.:

Adresse Versicherer (VAD oder Vertrauensarzt):  Adresszusatz:

PLZ:  Ort:

### Medizinische Daten:

- Die Patientin/der Patient leidet an einem Kurzdarmsyndrom und ist abhängig von parenteraler Ernährung
- Die Patientin/der Patient befindet sich in einer stabilen Phase und bei der Patientin/dem Patienten wurde nach dem chirurgischen Eingriff eine Phase der intestinalen Adaption abgewartet

Ätiologie des Kurzdarmsyndroms:

Anatomie und Länge des verbleibenden Darms:

Bisheriger Verlauf und allfällige Komplikationen:

Zur parenteralen Ernährung: Diese besteht seit (MM/JJJJ):

Aktuelles Volumen (Liter pro Tag):

### Geplante Abklärungen vor der Therapie gemäss Empfehlungen:

- CT-Scan  Darmspiegelung  Analyse der Herzfunktion
- Brustuntersuchung  Gebärmutterhals-Screening  Ernährungsevaluation

Andere, Ergänzungen:

Therapiealternativen? Gründe für die Therapiewahl mit Revestive® (bitte Literatur beilegen):

Geplante Therapie (Auszug Fachinformation):

*Erwachsene:* Die empfohlene Dosis von Revestive beträgt 0,05 mg/kg Körpergewicht einmal täglich mittels subkutaner Verabreichung.  
*Kinder und Jugendliche (≥1 Jahr):* Die Behandlung sollte unter der Aufsicht eines Arztes mit Erfahrung bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Kurzdarmsyndrom (KDS) begonnen werden. Die empfohlene Dosis Revestive bei Kindern und Jugendlichen (im Alter von 1 bis 17 Jahren) ist die gleiche wie für Erwachsene (0,05 mg/kg Körpergewicht subkutan einmal täglich). Bei erwachsenen Patienten sowie Kindern und Jugendlichen mit einer mässigen oder schweren Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clearance <50 ml/min) und bei Patienten mit terminalen Nierenerkrankungen sollte die tägliche Dosis um 50% reduziert werden. Eine Tabelle mit den Injektionsvolumina pro Körpergewicht ist auf der swissmedics Seite abgebildet. (Siehe auch [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch))

Beantragte Dosierung:  mg/kg Körpergewicht einmal täglich

Falls von der Fachinformation abweichende Dosierung, bitte begründen:

**Ärztin/Arzt:**

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ:

Ort:

Tel.

Fax:

E-Mail:

bei Spital zusätzlich Name des Spitals:

Abteilung:

Datum:

(Siehe auch [swissmedicinfo](http://www.swissmedicinfo))