

# Zirabev (Bevacizumab)

## Krebstherapie, zeitlich dringende Anfrage

Kostengutsprache gesuch zu Handen des Vertrauensarztes Limitatio: siehe nächste Seite

Für Indikationen Ovarialkarzinom, Eileiterkarzinom, primäres Peritonealkarzinom

Folgender Indikationscode ist an den Krankenversicherer zu übermitteln: 21090.05.

### Personalien Patientin:

Name:	<input type="text"/>	Vorname:	<input type="text"/>	Geb. Datum:	<input type="text"/>
Strasse:	<input type="text"/>	Adresszusatz:	<input type="text"/>		
PLZ:	<input type="text"/>	Ort:	<input type="text"/>		

### Krankenversicherer:

Krankenversicherer:	<input type="text"/>	Versicherten-Nr.:	<input type="text"/>
Adresse Versicherer (VAD oder Vertrauensarzt):	<input type="text"/>	Adresszusatz:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>	Ort:	<input type="text"/>

### Diagnose (ausschliesslich für Vertrauensärztin/Vertrauensarzt bestimmt):

Die Patientin leidet an einem **Ovarialkarzinom**, ist **nicht vorbehandelt** und in FIGO Stadium III oder IV. Der Tumor konnte nicht vollständig reseziert werden und die Patientin profitiert nicht potenziell von einer im Anschluss an die Chemotherapie durchzuführenden weiteren Operation (Second look mit interval debulking). Geplant ist eine Therapie mit Zirabev in Kombination mit Carboplatin und Paclitaxel.

Die Patientin leidet an einem:  **epithelialen Ovarialkarziom**  **Eileiterkarzinom**  
 **primärem Peritonealkarzinom**, welches

**Rezidivierend, platin-sensitiv** ist. Es besteht ein platinfreies Intervall von mindestens 6 Monaten. Geplant ist eine Zirabev Therapie in Kombination mit Carboplatin und Gemcitabin oder in Kombination mit Carboplatin und Paclitaxel

**Rezidivierend, platin-resistent** ist. Die Patientin wurde mit bis zu zwei vorgängigen Chemotherapieregimen behandelt, ist jedoch nicht mit Bevacizumab oder anderen VEGF-Inhibitoren vorbehandelt. Geplant ist eine Zirabev Therapie in Kombination mit Paclitaxel, Topotecan oder pegyliertem liposomalem Doxorubicin.

### Bemerkungen/Ergänzungen

### Anfragender Arzt/Ärztin:

Name:	<input type="text"/>	Vorname:	<input type="text"/>
Adresse:	<input type="text"/>	Adresszusatz:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>	Ort:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>	E-Mail:	<input type="text"/>
bei Spital, zusätzlich Name des Spitals:	<input type="text"/>	Abteilung:	<input type="text"/>
Datum:	<input type="text"/>		

**Limitatio (Auszug):****Ovarialkarzinom**

Nach Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation und Genehmigung des Vertrauensarztes für die Therapie nicht vorbehandelter Patienten mit Ovarialkarzinom (FIGO Stadium III und IV), bei welchen der Tumor nicht vollständig reseziert werden konnte und welche von einer im Anschluss an die Chemotherapie durchzuführenden weiteren Operation (Second look mit interval debulking) nicht potenziell profitieren. Zirabev wird nach 6 Zyklen in Kombination mit Carboplatin und Paclitaxel während 15 Monaten oder, falls diese eher eintritt, bis zur Progression der Krankheit vergütet.

Nach Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation und Genehmigung des Vertrauensarztes in Kombination mit Carboplatin und Gemcitabin oder in Kombination mit Carboplatin und Paclitaxel zur Behandlung von Patienten mit rezidivierendem, platinsensitivem epitheliale Ovarialkarzinom, Eileiterkarzinom oder primärem Peritonealkarzinom (mit einem platinfreien Intervall von mindestens 6 Monaten). Nach 6 bis 10 Zyklen in Kombination mit Carboplatin und Gemcitabin oder in Kombination mit Carboplatin und Paclitaxel über eine Dauer von 6-8 Behandlungszyklen wird Zirabev bis zur Progression der Krankheit vergütet.

Zirabev ist indiziert in Kombination mit Paclitaxel, Topotecan oder pegyliertem liposomalem Doxorubicin zur Behandlung von Patienten mit rezidivierendem, platin-resistentem epitheliale Ovarialkarzinom, Eileiterkarzinom oder primärem Peritonealkarzinom, die mit bis zu zwei vorgängigen Chemotherapieregimen behandelt wurden, und nicht vorbehandelt wurden mit Bevacizumab oder anderen VEGF-Inhibitoren. Nach ca. 6 Zyklen in Kombination mit Paclitaxel, Topotecan oder pegyliertem liposomalen Doxorubicin wird Zirabev bei entsprechender ärztlicher Verordnung bis zur Progression der Krankheit vergütet. Folgender Indikationscode ist an den Krankenversicherer zu übermitteln: 21090.05.

Siehe auch [Spezialitätenliste](#)